

Test Kinsey

¿Què sabem de la sexualitat?

Discrepàncies sobre dimensions, mètodes o sensacions no fan sinó posar en evidència que la sexualitat és un terreny de debat constant i, de vegades, poc clar. Els resultats d'aquest innocent test poden sorprendre més d'un "expert" en la matèria.

En 1990 aparegué *The Kinsey Institute New Report on Sex: What You Must Know to Be Sexually Literate* que és el darrer estudi sobre el comportament sexual fet als EUA. L'institut Kinsey és un dels centres capdavanters en l'estudi del comportament sexual humà; els seus treballs sobre la sexualitat masculina (1948) i femenina (1953) són considerats encara com les principals contribucions modernes al coneixement de la sexualitat.

L'informe es basa en una enquesta feta a 1.974 persones i demostra una baixa informació sexual, ja que el 55% dels enquestats responen incorrectament a més de la meitat de les preguntes del test.



1. ¿Quant de temps pot sobreviure l'esperma dins el cos de la dona?

- a. Uns 45 minuts
- b. Unes 12 hores
- c. Uns 2 dies
- d. Uns 8 dies

2. Una vegada ja dins del cos de la dona, ¿quant de temps tarda l'esperma a arribar a l'òvul?

- a. Uns 5 minuts
- b. Uns 30 minuts
- c. Unes 5 hores
- d. Uns 5 dies

3. ¿En un embaràs, quantes probabilitats hi ha que siga xiquet?

- a. Un 50%
- b. Un 40%
- c. Un 60%



4. Una xica pot quedar embarassada abans de la seua primera regla.

Vertader o fals.

5. Les dones que prenen la píndola haurien de fer un descans de sis mesos cada dos anys aproximadament.

Vertader o fals.

6. Quan una parella desitja tenir un fill, no s'ha de preocupar per la seua possible esterilitat mentre l'intent per aconseguir un embaràs no ha durat

- a. 3 mesos
- b. 6 mesos
- c. 9 mesos
- d. 12 mesos
- e. 18 mesos



7. Una dona no pot quedar embarassada mentre alleta.

Vertader o fals.

8. ¿Quina de les substàncies següents és afrodisíaca?

- a. Gingseng

- b. Mandràgora
- c. Cantàrida
- d. Vitamina E
- e. Cap de les anteriors



9. Les dones, més que els homes, experimenten un "menor desig sexual".

Vertader o fals.



10. ¿Quina és la llargària mitjana del penis en erecció?

- a. 10 centímetres
- b. 15 centímetres
- c. 20 centímetres
- d. 25 centímetres



11. L'abstinència sexual, incloent-hi la

masturbació, no comporta cap risc per a la salut.

Vertader o fals.

12. Moltes dones han d'aprendre a experimentar un orgasme.

Vertader o fals.



13. Quina és la mitjana de relacions sexuals d'una parella entre els 20 i 40 anys?

- a. Una vegada al dia.
- b. 4 o 5 vegades a la setmana.
- c. 2 o 3 vegades a la setmana.
- d. Una vegada a la setmana.

14. Els orgasmes simultanis no són freqüents i probablement no val la pena d'esforçar-se a aconseguir-los.

Vertader o fals.

15. Quin percentatge d'homes ha tingut com a mínim una experiència homosexual amb orgasme inclòs?

- a. Un 3%
- b. Un 10%
- c. Un 20%
- d. Un 35%



16. De cada 100 dones que confien amb el coïtus interruptus com a mètode anticonceptiu, quantes es queden embarassades al cap d'un any?

- a. Un 10%
- b. Un 15%
- c. Un 25%
- d. Un 40%

17. La pràctica de la dutxa vaginal...

- a. Pot contribuir a evitar l'embaràs.
- b. Pot contribuir a evitar la transmissió d'una malaltia sexual.
- c. No cal per a la "higiene femenina".
- d. No és mai dolenta.

18. Quin percentatge aproximat de les protuberàncies que una dona pot detectar-se als pits no són cancerosos?

- a. 80%
- b. 60%
- c. 50%
- d. 20%

19. Les principals organitzacions contra el càncer recomanen que una dona es faci la primera mamografia entre

- a. els 20 i 30 anys.
- b. els 35 i 40 anys.
- c. els 40 i 45 anys.
- d. els 45 i 50 anys.



20. Començant a la pubertat i durant tota la resta de la seua vida, amb quina freqüència hauria un home d'examinar-se els testicles?

- a. Una vegada a la setmana.
- b. Una vegada al mes.
- c. Una vegada cada any.
- d. No mai. L'examen l'ha de fer un metge.

21. Quins efectes pot produir sobre l'home l'abús de l'alcohol?

- a. Augmenta els pits.
- b. Pèrdua del desig sexual.
- c. Pèrdua de la capacitat d'erecció.
- d. Reducció del volum dels testicles.
- e. Tots els esmentats.
- f. Cap dels citats.

22. Per regla general els homes solen

contagiar més malalties sexuals a les dones que no a l'inrevés.

Vertader o fals.

23. Una vegada s'ha tingut una malaltia de transmissió sexual, s'hi queda immunitzat.

Vertader o fals.



24. El virus de la sida pot propagar-se per

- a. compartir coberts amb la persona infectada.
- b. els mosquits.
- c. rebre l'esternut d'una persona infectada.
- d. els seients del wàter.
- e. totes les formes anteriors.
- f. cap d'elles.

25. En quines malalties els medicaments prescrits poden alterar la funció sexual?

- a. Hipertensió.
- b. Cardiopaties.
- c. Artritis.
- d. Depressió.
- e. a i b.
- f. Totes les esmentades.

Josep Roig

Solucions:

- Puntuació:
- 22-25 respostes correctes: Excel·lent
 - 19-21 respostes correctes: Notable
 - 17-18 respostes correctes: Bé
 - 16 respostes correctes: Aprovada
 - 15 respostes correctes: Suspena
- 14. Vertader
 - 15. c o d (els estudiadors hi discrepen)
 - 16. c
 - 17. c
 - 18. a
 - 19. b
 - 20. b
 - 21. e
 - 22. Vertader
 - 23. Fals
 - 24. f
 - 25. f
- 1. d
 - 2. a
 - 3. a
 - 4. Vertader
 - 5. Fals
 - 6. d
 - 7. Fals
 - 8. c
 - 9. Fals
 - 10. b
 - 11. Vertader
 - 12. Vertader
 - 13. c